

Infecção peridontal grave no paciente HIV positivo, com comprometimento de via aérea.

Flávia Lobão, Leonardo Guerreiro, Carlos Alberto Siqueira, Fabio Basílio, Elizabeth Macieira.
Hospital Municipal Evandro Freire, RJ.

A infecção peridontal é uma manifestação bastante comum no paciente HIV positivo, sendo muitas vezes, um indicativo da doença, associado a candidíase oral de repetição. Indivíduos portadores do HIV apresentam uma maior gravidade da doença periodontal, segundo parâmetros clínicos, acompanhada de um aumento na prevalência de *P. gingivalis* e *T. forsythia* em relação a indivíduos HIV negativos. Paciente J.S.R, masculino 28 anos HIV, em uso de TARV há quatro anos, apresentou odinofagia por três dias e dificuldade de deglutir, foi atendido na emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, com sinais de SIRS, laringoespasma, edema cervical difuso e asfixia de vias aéreas, submetido a cervicotomia e traqueostomia de emergência pela equipe da cirurgia geral. Após ser atendido pela dentista Intensivista na UTI, foi evidenciado foco infeccioso periodontal, trismo grave e confirmado por imagem, tomografia com contraste, a existência de focos gasosos de permeio na região anterior do pescoço. Após a inclusão de esquema antimicrobiano para cobertura do anaeróbio de boca, o paciente foi submetido exérese do foco infeccioso em centro cirúrgico, paciente teve alta da UTI em 72 horas.